




Faune-Alsace infos

Numéro 4 - Juin 2017

Faune-Alsace 2016

Les fiches de synthèse pour l'année 2016 du projet Biodiv'Alsace sont consultables sur le site d'Odonat.

Vous trouverez les bilans de l'activité de la base Faune-Alsace [[LIEN](#)]. L'année écoulée s'est ainsi avérée celle de la plus importante participation depuis le début du projet (moyenne : 609 observations transmises chaque jour).



Évolution du nombre donnée transmises annuellement

Vous accéderez également aux résultats synthétiques des suivis d'espèces menés dans le cadre du projet Suivi des Indicateurs de Biodiversité en Alsace [[LIEN](#)].

À ne pas rater !

Vous pouvez encore vous inscrire pour l'enquête communale sur l'Hi-rondelle de fenêtre. La recherche des nids est à faire de mi-juin à mi-juillet.

N'attendez pas ! Cliquez ==>



Les photos présentées dans ce document ont été postées dans la [galerie Faune-Alsace](#). Vous pouvez retrouver l'image originelle en cliquant sur chaque photo. [Couverture Crapaud vert (C. Hiegel, 17/05/2017) ; Sphinx gazé *Hemaris fuciformis* (M. Ehrhardt, 21/05/2017)]

24 heures de la biodiversité 2017

Une trentaine de naturalistes dans le Bassigny les 13-14 mai pour la première de l'édition Lorraine/Champagne, et près d'une centaine les 3-4 juin pour la huitième édition de cette manifestation en Alsace (et Moselle). Les 24 heures 2017 ont été un succès ! Une synthèse sera mise en ligne dès que possible sur le site d'Odonat. Merci à tous les participants, ainsi qu'à la commune de Neuwiller-lès-Saverne pour son accueil... et à l'année prochaine !



Photos : A. Fizesan ; A. Keller ; D. Oesterlé ; L. Razafindralay ; D. Schott ; S. Stein ; E. Lohmer

La clique des clics

Insolites, drôles ou simplement réussies... une sélection des photos du mois postées dans la [galerie Faune-Alsace](#).

Vous pouvez retrouver l'image originelle en cliquant sur chaque photo.




Traquet motteux (L. Bories, 25/05)



Torcol fourmilier (G. Meyer, 25/05)



Caloptéryx vierge (M. Solari, 28/05)



Hirondelle rustique (M. Solari, 28/05)



Héron pourpré (D. Eichhorn, 30/05)



Geina didactyla (M. Ehrhardt, 21/05)



Libellule fauve (N. Mokuenko, 05/05)

Observations marquantes mai 2017

Cette rubrique synthétise certaines observations (et photos !) enregistrées dans la base de données Faune-Alsace pour le mois de mai 2017.

Merci à tous les contributeurs.



23 341 observations de 229 taxons.

PCA : Petite Camargue Alsacienne / CHR : Comité d'Homologation Régionale

Ardéidés

8 des 9 espèces françaises sont observées durant ce mois de mai. 1 **Crabier chevelu** est noté le 11 puis le 16 en PCA. Un **Butor étoilé** tardif chante le 8, toujours en PCA. Le mois de mai s'accompagne également du retour des **Blongios nains** (2 données). Total de 24 données de **Héron pourpré** avec un maximum de 3 oiseaux le 25 en PCA et 13 données de **Bihoreau gris**. De nombreuses **Grandes aigrettes** (51 données) sont encore notées, dont quelques individus en plumage nuptial.



Héron pourpré (F. Havet, 17/05)



Bihoreau gris (T. Lux, 26/05)

Monticole de roche

Présence peu habituelle d'une femelle dans le secteur du Hohneck le 18.

Hirondelle de rochers

2 individus sont contactés au Hohneck le 14. Également 2 individus sont présents au Lac Blanc le 22. Toujours 2 individus le 25 au pied du Petit Ballon.

Pluvier guignard

Deux oiseaux en halte sur les chaumes vosgiennes le 05.

Jaseur boréal

Un individu isolé est observé le 05 dans les Vosges.

Cigogne Noire

1 individu le 13 en PCA et un autre le 21 en migration au-dessus de Rouffach-68.

Grue cendrée

Encore 2 grues en migration sont observées le 14 en Alsace Bossue, puis un individu fait halte à Sélestat-67 le 20.

Spatule blanche

Un adulte fait halte à Aspach-le-Bas-68 le 15. Un individu (le même ?) est également noté à Bischoffsheim-67 le 21.



Spatule blanche (M. Solari 15/05)

Pipit rousseline

1 individu le 13 à Blotzheim-68. 3 autres individus sont observés le 10 dans le nord de l'Alsace.

Guêpier d'Europe

Passage marqué de guêpiers dans toute la région (25 données) avec un pic le 10 mai et 6 vols signalés.

Bruant ortolan

1 individu en halte le 12 à Westhalten-68 et 1 le 14 à Sainte-Croix-en-Plaine-68

Mouettes mélanocéphale et pygmée

Encore une Mouette mélanocéphale les 1 et 2 à Plobsheim-67. Quelques Mouettes pygmées (6 données) sont également contactées, principalement durant la première quinzaine, au plan d'eau de Plobsheim-67 exclusivement.

Observations marquantes mai 2017

Guifettes

Les trois espèces de guifettes européennes sont contactées ce mois de mai. De loin la plus abondante, la **Guifette noire** totalise 14 données avec un maximum de 85 individus le 30 au plan d'eau de Plobsheim-67. La **Guifette moustac** (5 obs., maximum de 5 le 14 et le 28) est bien plus rare. La dernière, la **Guifette leucoptère** est vraisemblablement la plus occasionnelle. Seules 3 observations sont réalisées, à Strasbourg, Village-Neuf-68 et Plobsheim.



Guifette leucoptère (T. Lux, 30/05)

Marouette ponctuée

Un mâle chante dans une petite zone humide au nord de Strasbourg le 21.

Limicoles

Le passage migratoire des limicoles continue avec 3 **Courlis corlieux** le 8 à Plobsheim-67, 2 **Tournepierres à collier** du 17 au 21 à Village-Neuf-68, 1 **Échasse blanche** et 1 **Chevalier arlequin** le 5 dans une gravière de la Hardt-68. Encore quelques **Combattants variés** (14 données), **Chevaliers sylvains** (43 données), **Chevaliers aboyeurs** (21 données), **Chevaliers gambettes** (13 données) **Grands Gravelots** (23 données), **Bécassines des**

marais (24 données), **Bécasseaux variables** (3 données) et 1 **Bécasseau minute** sont observés durant ce mois de mai.



Echasse blanche (R. D'agostino 05/05)

Alouette calandrelle

Tout comme en 2016 à la même période, une **Alouette calandrelle** (homologuée par le CHR**) fait halte les 3 et 4 mai du côté de Hégenheim-68



Alouette calandrelle (S. Eichhorn 16/04)

Fauvettes paludicoles

Durant le mois de mai, la migration (et pourquoi pas le cantonnement) des fauvettes se poursuit dans les zones humides.

Cela concerne entre autre la **Rousserolle turdoïde** (13 données) et le **Phragmite des joncs** (10 données).



Phragmite des joncs J. Curie, 10/05)



Rousserolle turdoïde (T. Lux, 22/05)

Observations marquantes mai 2017



Vautour fauve (J. Curie, 13/05)



Balbuzard pêcheur (H. Enoch, 31/05)



F. Kobez (J. Chervaux, 27/05)

Rapaces

Ce mois de mai a été riche concernant les rapaces migrateurs. Il marque notamment le passage de la **Bondrée apivore** (42 données). Parmi les plus remarquables, notons le passage d'un **Vautour fauve** le 13 dans le massif vosgien, du **Circaète Jean-le-Blanc** (1 le 7 dans la vallée de Thann-68 et 1 le 14 à Ungersheim-68) et du **Faucon kobez** (1 femelle le 13 en PCA, une autre le 27 en Alsace Bossue). D'autres migrateurs ont également traversé la région comme le **Busard cendré** (6 données), le **Balbuzard pêcheur** (10 données) et les derniers **Busards Saint-Martin** (5 données).



Busard cendré (F. Havet, 25/05)

En vrac ...


Les premiers **Gobemouches à collier** sont contactés dès le 5 en Alsace Bossue. D'autres oiseaux nicheurs remarquables font leur retour au mois de mai comme le **Pouillot de Bonelli** (6 données), le **Petit-duc scops** (2 données), l'**Hypolaïs icterine** (33 données) et l'**Hypolaïs polyglotte** (49 données). Encore 24 données de **Sarcelle d'été**. Notons la présence régulière de la **Nette rousse** (24 données) et du **Tadorne de Belon** (28 données). Trois nichées de **Harle bièvre** sont découvertes à Sélestat-67, Sausheim et Petit-Landau-68. Un nombre record de 19 **Faucons hobereaux** minimum en chasse au plan d'eau de Plobsheim le 13.



Hypolaïs polyglotte (F. Havet, 21/05)



Faucon hobereau (O. Steck, 08/05)



Harle bièvre (K. Makroum, 30/05)

Observations marquantes mai 2017



HERPÉTOFAUNE

666 observations de 23 taxons (amphibiens)

377 observations de 11 taxons (reptiles)

Bilan des 24 heures de la biodiversité

La huitième édition des 24h de la biodiversité a eu lieu le week-end du 3 et 4 juin sur les collines sous-vosgiennes, autour de Neuwiller-lès-Saverne et Phalsbourg. Cette année encore vous avez été nombreux à participer à cet événement convivial et les observations herpétologiques ont été au rendez-vous ! En effet, **Sonneur à ventre jaune**, **Lézard des murailles**, **Lézard des souches**, **Lézard vivipare** et **Coronelle lisse** se sont fait voir.

Notons également l'observation d'un **Orvet fragile** mâle présentant des points bleus. Cette ponctuation apparaît pendant la période de reproduction sur une courte durée. Ce phénomène est connu mais très certainement sous-estimé car très peu mentionné dans notre base de données. N'hésitez pas à préciser ce genre de détail lorsque vous enregistrez une donnée dans faune-alsace.




Orvet fragile, morphe à points bleus (V. Noël 03/06)

Gonflements, dépigmentations, tailles inhabituelles...

Ce printemps, quelques données d'observations d'Amphibiens signalent certaines anomalies comme des gonflements (3), des dépigmentations (1) ou encore des tailles inhabituelles (2). Les causes précises ne sont pas identifiées. Toutefois, ces déformations pourraient être le résultat d'un stress développé au contact d'un polluant ou d'une réaction à un pathogène. Les alertes concernant les chytrides ou les ranavirus étant toujours d'actualité [\[LIEN\]](#). Alors n'hésitez pas à transmettre les détails de vos observations inhabituelles.



(1) Crapaud calamite (T. WALTZER)



(2) Grenouille rieuse (L. Grodwohl)



(3) Sonneur à ventre jaune (D. Staub, 17/05)



MAMMIFÈRES

739 observations de 35 taxons.

Plus de 130 observations de Lièvre d'Europe en ce mois de mai 2017, essentiellement des individus solitaires.



Lièvre d'Europe (S. Bendinelli, 30/05)

Les observations de Hérisson d'Europe sont en forte hausse ce mois-ci : malheureusement les trois-quarts des 80 données enregistrées sur Faune-Alsace concernent la mortalité routière.

Les premières mises bas ont eu lieu pour certaines espèces de mammifères, à l'instar du Sanglier, observé une trentaine de fois dont près de la moitié avec des marcassins. Idem pour le Renard roux, avec une douzaine d'observations de renardeaux.



Sanglier (M. Wilb, 16/05)

La clique des clics



Écureuil roux (A. Deichel, 25/05)



Lièvre d'Europe (M. Solari, 04/05)



Geai des chênes (S. Umhang, 08/05)



Lièvre d'Europe (M. Solari, 04/05)



Renard roux (M. Wilb, 03/05)



Renard roux (M. Wilb, 12/05)



Faucon crécerelle (R. Muller, 02/05)



Daim européen (E. Tringler, 23/05)



Lièvre d'Europe (B. Regisser, 15/05)

Observations marquantes mai 2017

LIBELLULES

1354 observations de 51 taxons.

Comme souvent en début de saison, la **Libellule fauve** *Libellula fulva* et le **Caloptéryx éclatant** *Calopteryx splendens* sont les espèces les plus signalées (127 obs' chacune).

La **Leucorrhine à gros thorax** *Leucorrhinia pectoralis* n'a été signalée que dans la bande rhénane moyenne, sur ses stations habituelles (13 obs'). La **Leucorrhine à large queue** *Leucorrhinia caudalis* a par contre été signalée de deux nouvelles stations dans le Bas-Rhin (sablière de Brumath et plan d'eau à Gundershoffen). Cela confirme l'évolution positive dont semble faire preuve cette libellule protégée depuis quelques années. Une attention soutenue doit donc être portée sur tous les petits plans d'eau pendant le mois de juin, les mâles étant généralement facilement observables aux jumelles posés sur les hydrophytes flottants. Les prospections menées dans les habitats favorables les plus proches des stations rhénanes bas-rhinoises n'ont cependant rien donné : cette espèce n'est donc toujours pas connue du Haut-Rhin !



Leucorrhine à large queue *Leucorrhinia caudalis* (T. Lux, 16/05)

À nouveau une belle moisson d'obs' (20) d'une autre espèce en progression, l'**Aesche isocèle** *Aeshna isoeles*, signalée surtout dans les milieux rhénans.

Les obs' disséminées du **Sympétrum à nervures rouges** *Sympetrum fonscolombii* témoignent de la classique dispersion printanière annuelle de cette libellule migratrice.



Sympétrum à nervures rouges *S. fonscolombii* (B. Regisser, 28/05)

Enfin, les 24 heures de la biodiversité 2017 ont permis d'observer le **Cordulégastre bidenté** *Cordulegaster bidentata* pour la première à l'ouest des Vosges en Alsace, à Bust-67. Si cette obs' est logique, elle augure d'un nouveau territoire de recherche : les suintements des forêts d'Alsace Bossue ou de la frange ouest des Vosges du Nord [LIEN].



Cordulégastre bidenté *Cordulegaster bidentata* (S. Stein, 03/06)

PAPILLONS

Rhopalocères

2352 observations de 78 taxons.

2017 semble une bonne année pour l'**Échiquier** *Carterocephalus palaemon*. Quoique répandue, cette hespérie printanière des lisières et clairières est habituellement observée au compte-gouttes (moins d'une quarantaine d'obs' par an). 45 obs' ont été transmises pour le seul mois de mai !



Echiquier *Carterocephalus palaemon* (M. Ehrhardt, 29/05)


C'est également le cas pour la première génération du **Cuivré des marais** *Lycaena dispar* avec déjà une vingtaine d'obs' dispersées à basse altitude dans les deux départements.



Cuivré des marais *Lycaena dispar* (G. Meyer, 25/05)

Observations marquantes mai 2017

Parmi les obs' les plus remarquables du mois, la découverte d'un Azuré du Thym *Pseudophilotes baton* au Bollenberg-68 est exceptionnelle. Aujourd'hui cantonnée dans la massif vosgien, l'espèce n'avait plus été signalée sur les collines calcaires depuis de longues années. Elle semble également disparue de la Hardt et du Jura alsacien.



Azuré du Thym *Pseudophilotes baton* (T. Lux, 20/05)

Les collines de Rouffach sont également la seule station de l'Hespérie du Carthame *Pyrgus carthami*, et plusieurs obs' ont été faites en mai, contrairement aux deux années précédentes.



Hespérie du Carthame *Pyrgus carthami* (M. Solari, 23/05)

Hétérocères

1831 observations de 303 taxons.

303 espèces de papillons nocturnes signalées par les naturalistes nyctalopes, dont de gros calibres comme :



Sphinx du Peuplier *Laothoe populi* (P. Hey, 29/05)

des tape-à l'œil comme :



Angéronie du Prunier *Angeronia prunaria* (M. Ehrhardt, 24/05)

des tordeuses somptueuses comme :



Olethreutes arcuella (M. Ehrhardt, 29/05)

ou de vraies raretés comme :



Argentine *Spatalia argentina* (T. Lux, 12/05)

signalée pour la première fois sur FA.

Observations marquantes mai 2017



ORTHOPTÈRES

383 observations de 14 espèces (adultes).

L'observation du mois est indéniablement la redécouverte du **Grillon des marais** *Pteronemobius heydenii* (cf. FA infos n°3). Plusieurs chanteurs ont ainsi été trouvés sur les berges d'une zone humide renaturée il y a plusieurs années sur l'île du Rhin-68. Cela faisait 23 ans que l'espèce n'avait plus été vue dans le Haut-Rhin, où elle n'était connue que de la PCA.



Grillon des marais *Pteronemobius heydenii* (R. D'agostino, 26/05)

Un autre grillon peu répandu, le **Grillon bordelais** *Eumodicoryllus bordigalensis* a également été entendu à Altkirch-68 le 13/05.

Les premiers criquets chanteurs sont précoces cette année ! Le 17-mai le **Criquet duettiste** *Chorthippus brunneus* (Kientzheim-68), le 23-mai le **Criquet des clairières** *Chrysochraon dispar* (Obenheim-67), le 27-mai le **Criquet verdelet** *Omocestus viridulus* (Stosswehr-68), le 30-mai le **Criquet des pâtures** *Pseudochorthippus parallelus* (Biederthal-68) et le 31-mai le **Criquet de la Palène** *Stenobothrus lineatus* (Heiteren-68). La première sauterelle chanteuse est la **Decticelle bariolée** *Roeseliana roeselii* le 31-mai à Staffelfelden-68.

Enfin, concernant les Tétrix, trois stations de Tétrix à ailes

courtes *Tetrix kraussi* ont été trouvées (et une reconfirmée) dans la Hardt (Bois de Rothleible et Niederwald) ; deux stations de Tétrix commun *Tetrix undulata* ont également été confirmées dans la plaine haut-rhinoise, comme toujours dans la bande-rhénane à Geiswasser.




Criquet des clairières *Chrysochraon dispar* (R. D'agostino, 23/05)



AUTRES INSECTES

Ascalaphe soufré *Libelloides coccajus*

Traditionnelle moisson d'obs' pour ce névroptère printanier, tant dans la Hardt que le long de la bande haut-rhinoise, et jusqu'à Marckolsheim-67.



Ascalaphe soufré *Libelloides coccajus* (M. Ehrhardt, 04/05)

Xylocopes

Trois espèces d'abeilles charpentières ou Xylocopes peuvent être observées en Alsace [LIEN].

La plus rare, *Xylocopa iris*, vient d'être observée à Thann-68. Plus petite, avec une aire de répartition surtout méridionale, elle niche dans les tiges creuses.



Xylocopa iris dans une tige tige sèche de laitue vireuse *Lactuca virosa* (J.-C. Jacob, 27/05)

Les deux autres espèces, *Xylocopa violacea* et le *Xylocopa valga*, sont nettement plus imposantes, et forent des galeries dans le bois mort. Leur distinction est délicate. Seul le mâle de *Xylocopa violacea* dont les antennes arborent des articles roux distinctifs est facilement identifiable posé.

Afin de clarifier le jeu de données actuel, le taxon Xylocope indéterminé *Xylocopa sp.* a été ouvert. Dorénavant, toutes les données de grands Xylocopes sans capture et examen détaillé devront être enregistrées sous *Xylocopa sp.*, à l'exception des mâles de *Xylocopa violacea* avec photo ou description précisant les caractères observés. [NB : toutes les anciennes données de *Xylocopa violacea* ne répondant pas à ces critères seront renommées en *Xylocopa sp.*]

La clique des clics



Couleuvre à collier (V. Noël, 28/05)



Couleuvre à collier (Y. Gross, 10/05)



Lézard des souches (M. Solari, 13/05)



Nymphe au corps de feu (D. Holtz, 25/05)



Rainette verte (J.-P. Joachim, 25/05)



Salamandre tachetée (J.-P. Joachim, 26/05)



Lézard des murailles (D. Holtz, 12/05)



Leucorrhine à gros thorax (T. Lux, 28/05)




Crapaud calamite (A. Chapman, 06/05)



Sonneur à ventre jaune (R. Moratin, 27/05)



Renard roux (M. Wilb, 30/05)



Leucorrhine douteuse (T. Lux, 25/05)



© Jean-Pierre VACHER

L'Alyte accoucheur
Alytes obstetricans

Zoom sur



© Jean-Pierre VACHER

Mâle transportant ses œufs et mare de reproduction (J.-P. Vacher)

Discret comme un Alyte

L'Alyte accoucheur est une espèce qui s'observe dans des milieux où un substrat minéral (sable ou galets) est présent.

La régression des zones naturelles avec ces caractéristiques, telles les berges non canalisées de cours d'eau (Exemple : l'III), a poussé l'espèce dans des milieux dits "secondaires". On le retrouve maintenant dans des milieux pionniers et continuellement remaniés par l'homme, comme des gravières ou des sablières ou dans des zones plus urbaines comme les cimetières.

Les talus à pentes fortes lui permettent de trouver de nombreuses cavités qu'il utilise pour se cacher des regards indiscrets. Et le contact auditif est également délicat ! Son chant est difficile à repérer car la portée du son est réduite par l'absence de sacs vocaux et par la zone d'émission (individus souvent tapis au fond d'une crevasse).

Un travail de mâle

L'Alyte accoucheur est surtout connu pour son mode de reproduction atypique. Contrairement aux autres anoures de notre région, la femelle ne dépose pas directement ses œufs dans un point d'eau. Elle met le mâle à contribution ! En effet, lors de l'accouplement qui se déroule à terre, le mâle enroule les œufs autour de ses pattes arrière.


Au cours des trois à huit semaines de développement, il pourra les tremper dans l'eau régulièrement afin de les hydrater. Les œufs seront déposés dans l'eau juste avant leur éclosion. La métamorphose des têtards peut intervenir avant ou après l'hiver.


Une situation délicate

L'Alyte accoucheur est rare en Alsace. Sa présence est attestée uniquement dans le Haut-Rhin en petites populations isolées. Ces dernières années, de nouvelles stations ont été découvertes et laissent penser que des populations sont encore méconnues. Sorti d'hivernage depuis mars, il est encore possible de l'observer ou de l'entendre jusqu'au mois de juillet ! L'Alyte accoucheur est considéré « en danger » sur la liste rouge régionale. En conséquence, une bonne connaissance de sa répartition est primordiale pour sa protection.

Apportez votre contribution pour affiner les connaissances sur la répartition de l'espèce en participant à l'enquête « Alyte accoucheur et lacs de montagne » [\[LIEN\]](#) proposée par BUFO ! Vous pourrez également profiter du rendez-vous naturaliste du 1^{er} juillet 2017 qui sera exclusivement consacré à la recherche de cette espèce.

Pour plus d'informations ou pour participer à ces prospections, contacter Sarah BAOUCH, notre volontaire en service civique (service.civique2@bufo-alsace.org)





Zoom sur

la Crossope aquatique *Neomys fodiens*

Biologie

La Crossope ou Musaraigne aquatique est la plus grande et la plus spécialisée des musaraignes d'Europe. De 12 à 17 cm de long, dont 5 à 7 cm pour la queue, elle pèse aux alentours de 20 g. Son pelage présente une coloration noire sur le dos et blanche-voire grisâtre- sur le ventre, avec une ligne de démarcation bien nette. Le dessous de la queue présente une frange bien marquée avec des poils raides gris argentés. Les pieds sont également bordés de poils raides, qui facilitent la nage.

Espèce semi-aquatique, elle vit sur les berges des eaux courantes et stagnantes riches en végétation. Elle est d'ailleurs abondante dans les cressonnières. Les berges doivent avoir une pente assez importante pour y accueillir son nid creusé dans la berge, qui est fait de boules de végétaux.

Active principalement au crépuscule et de nuit, elle chasse surtout des invertébrés aquatiques (diptères, crustacés, mollusques) qu'elle détecte avec ses vibrisses sensibles

et mobiles et des petits vertébrés (alevins, batraciens). Les proies sont paralysées et tuées par une sécrétion toxique des glandes sous-maxillaires déversée dans la salive.

Les accouplements ont lieu d'avril à septembre avec un pic des naissances en mai-juin. La Crossope aquatique fait 2 à 3 portées par an de 3 à 15 petits chacune. Seule la femelle s'occupe des jeunes : ces derniers sont allaités pendant 1 mois et s'émancipent au bout de 5 à 6 semaines.

Sa durée de vie est environ de 2,5 ans en milieu naturel. Ses principaux prédateurs sont le Renard roux, le Héron cendré, le Brochet et les rapaces nocturnes.

Répartition

Cette espèce protégée occupe toute l'Europe centrale et septentrionale. En France, elle est présente partout, excepté en Corse, depuis les côtes marines jusqu'à 2000 m d'altitude dans les Alpes et les Pyrénées.

En Alsace, elle reste encore méconnue car trop peu recherchée. Elle est connue du Haut-Rhin, en particulier du Sundgau et du Jura alsacien, à l'exception de la Hardt où les habitats aquatiques lui semblent peu favorables. Elle est également présente en plaine agricole du Bas-Rhin ainsi que dans les Vosges du Nord.

L'Alsace Bossue, les Vosges moyennes et les Hautes-Vosges sont néanmoins lacunaires en prospections récentes.

Alors munissez-vous de patience, et à vos jumelles (ou à vos pelotes) !

De gauche à droite : R. Gentner (04/09/2013) ; J. Thiriet (04/09/2013) ; A. Frommelt (04/02/2011)



Pour la trouver

Bien qu'active toute l'année, la Crossope aquatique n'est pas aisée à repérer.

Le plus souvent, elle laisse des indices discrets comme des provisions d'escargots, de batraciens ou de poissons partiellement consommés. Elle emprunte aussi des chemins dans la végétation épaisse qui laissent des coulées. Des amas de crottes peuvent aussi être trouvés sur ces voies ou près de l'entrée de terriers.

Plus exceptionnellement, un individu peut être surpris nageant le long d'un cours d'eau ou traversant une mare.

Enfin, des crânes peuvent également être retrouvés dans des pelotes de rapaces nocturnes.



L'Hypolaïs ictérine, se reproduit dans les zones tempérées et boréales de l'Europe, jusqu'au centre de la Sibérie. En France, l'espèce est nicheuse uniquement dans les régions du Nord et de l'Est. Ses populations au contraire de la polyglotte sont en fort déclin depuis 1989.



N. Hoffmann (15/05/2011)



F. Havet (21/05/2017)

Zoom sur

Hypolaïs ictérine
Hippolais icterina

Hypolaïs polyglotte
Hippolais polyglotta

L'hivernage a lieu dans le sud de l'Afrique. Les premiers retours sont constatés en Alsace la dernière semaine d'avril avec un pic mi-mai – début juin. Les départs ont lieu à partir du mois d'août et les derniers passages en Alsace se font jusque début septembre.


L'ictérine habite des milieux arbustifs plus âgés, mais aussi plus « frais » et plus humides que la Polyglotte. Des arbres élevés dominant un sous-bois discontinu de buissons denses, entrecoupés d'espaces à la végétation herbacée exubérante, sont typiques de l'espèce. En Alsace, ce sont les ripisylves spontanées de bord de rivière, où quelques vieux arbres dominent des fourrés d'orties et de saules, les bosquets humides des rieds, les alignements de vieux peupliers et de haies bordant les fossés du Bruch de l'Andlau, les vieilles saulaies des « giessen » rhénans, mais aussi les bosquets de robiniers et les plantations de peupliers de plus de 15 ans envahies de buissons. Les vieux vergers hautes-tiges bordés de haies épaisses ne semblent plus guère occupés.

L'Hypolaïs ictérine est présente uniquement en plaine et très majoritairement dans le Bas- Rhin. Sa répartition y est très lacunaire : de nombreux secteurs favorables ne sont plus occupés.


Les distinguer

Le chant reste le meilleur moyen de distinguer ces deux espèces très semblables.

L'ictérine a un chant hésitant et décousu rappelant la Rousserolle verderolle, sonore, avec des sifflements discordants, des crécelles et des couinements. Un grand nombre d'espèces sont imitées avec une tendance à la double ou triple répétition des motifs de base, à la manière de la Grive musicienne. 🔊



Le chant de la Polyglotte est moins sonore. Il débute timidement avec des imitations répétées plusieurs fois de manière bien distincte, suit une cascade très rapide et soutenue incluant des imitations d'autres espèces (merle, moineau, hirondelle, ...)




L'Hypolaïs polyglotte, se reproduit dans les zones tempérées et méditerranéennes de l'Europe du Sud-Ouest et du Maghreb. Cette espèce est en expansion géographique et est maintenant présente dans toute la France, dans le sud de la Belgique, le Luxembourg, le sud-ouest de l'Allemagne et l'ouest de la Suisse. Après une régression depuis 1989, ses populations sont en augmentation depuis 2001 et bénéficient du réchauffement climatique.

Hivernante dans l'ouest de l'Afrique équatoriale, les premières observations sont faites la dernière semaine d'avril en Alsace avec un pic fin mai – début juin. Les départs ont lieu à partir du mois d'août et les derniers passages en Alsace se font jusque mi-septembre.

L'Hypolaïs polyglotte est une espèce plutôt thermophile, qui privilégie des milieux secs et bien exposés. Elle fréquente des milieux buissonnants avec un couvert dense mais discontinu. Elle apprécie la présence d'espaces dégagés et fréquente ainsi des milieux plus jeunes en termes de végétation. En Alsace, sa préférence va aux bordures de gravières ou aux gravières sèches en voie de recolonisation par les végétaux, les talus à l'abandon, et certaines friches péri-urbaines et jeunes plantations embroussaillées.

Bien implantée dans le sud de la région, mais en petit nombre, entre Bâle et Mulhouse ainsi que sur la bordure rhénane. Elle est régulière dans la région de Strasbourg et bien implantée en Alsace bossue. Encore sporadique ailleurs en plaine et à l'étagé collinéen, elle évite les massifs montagneux.

La clique des clics



Pouillot siffleur (A. Reszka, 13/05)



Pie bavarde (F. Merck, 23/05)



Faisan de Colchide (M. Solari, 21/05)



Spatule blanche (F. Havet, 15/05)



Busard des roseaux (F. Havet, 08/05)




Sterne pierregarin (B. Herquel, 10/05)



Milan noir (M. Solari, 23/05)



Mouette rieuse (O. Steck, 20/05)



Petit Gravelot (B. Herquel, 24/05)

AGENDA



Chamois (L. Bories, 10/05/2017)

Enquêtes, suivis

Rendez-vous naturalistes de BUFO

Dans le cadre de l'animation de la base de données herpétologique, BUFO vous propose un rendez-vous mensuel, le premier samedi de chaque mois, afin d'effectuer des prospections naturalistes dans le but de mieux connaître des zones sous-prospectées ou de rechercher des espèces rares et sensibles. En bref, un moment privilégié pour les naturalistes experts ou amateurs.

Samedi 01 juillet 2017

La quatrième édition des Rendez-vous Naturalistes aura comme objectif de rechercher l'étrange Alyte accoucheur dans le Haut-Rhin.

Une inscription par mail est obligatoire afin de pouvoir organiser les prospections au mieux en fonction du nombre de participants.

Pour y participer merci de contacter Sarah BAOUCH :
service.civique2@bufo-alsace.org


Inventaires Bufo / Imago

Dimanche 02 juillet 2017

Agrion de Mercure - Ried de Muttersholtz

Prospection Odonates en journée par petits groupes.

Rdv : 10 h samedi. Repas tirés du sac. Reporté si météo défavorable. Inscription par courriel à association.imago@free.fr



Biotope de l'Agrion de Mercure (R. Moratin, 20/06/2016)

Sorties nature

Pour tout public

Sorties nature LPO

Programme détaillé et inscriptions sur <http://alsace.lpo.fr>

Dimanche 09 Juillet 2017

La pie-grièche écorcheur et le loriot d'Europe

À la rencontre des pies-grièches écorcheurs entre vignes et vergers autour d'Ottrott. Nous serons certainement accompagnés du loriot d'Europe, du tarier pâtre, du rougequeue à front blanc, et de la fauvette grisette....

Guide: Jean-Marie RISSE

RV: 8h00 parking face à la mairie d'OTTROTT

Sorties nature GEPMA

Programme détaillé sur www.gepma.org

21 au 23 juin 2017

Animations à la découverte du Grand hamster et des autres mammifères de plaine d'Alsace

Dans le cadre de la manifestation Ferme d'Avenir Tour, le GEPMA proposera des animations pour petits et grands autour de son stand.

À partir du mercredi après-midi. OBERNAL.

Intervenant : Julie ROUX

samedi 1er juillet

Les yeux sur les chamois

Au travers d'une balade dans le massif vosgien, venez découvrir le milieu de vie de cette espèce gracieuse et peut-être aurez-vous la chance de l'observer !

18h - Munster. Intervenant : Éric BABILON.

Inscription obligatoire

Dimanche 23 juillet

Les yeux sur les chamois

Cette sortie émerveillera tous ceux qui ont le courage de sortir

de sous leur couette ! Au travers d'une balade dans le massif vosgien, venez découvrir le milieu de vie de cette espèce gracieuse et peut-être aurez-vous la chance de l'observer !

5h - Munster. Intervenant : Éric BABILON.

Inscription obligatoire

Samedi 29 juillet - soirée

« Nuit des étoiles »

Dans le cadre de cette manifestation astronomique estivale, venez découvrir les petites bêtes à poils qui, la nuit, sont reines. Le guide vous emmènera en balade et vous serez ainsi surpris devant la richesse des espèces présentes au plus près de chez vous.

20h - Strasbourg, SINE Bussière.

Intervenant : Hélène CHAUVIN.

La clique des clics



Rougequeue à front blanc (J. Curie, 05/05)



Aurore (M. Solari, 16/05)



Paon du Jour (A. Ebel, 27/05)




Azuré commun (A. Dujardin, 25/05)



Grande Tortue (C. Roquin, 14/05)



Lièvre d'Europe (J.-M. Frenoux, 13/05)



Coucou gris (F. Manguila, 30/04)



Panthère (J. Thiriet, 23/05)



Catephia alchymista (M. Ehrhardt, 24/05)



Pie-grièche écorcheur (E. Tringler, 17/05)



www.faune-alsace.org

Faune-Alsace est une base de données faunistiques,
ouverte à la participation de tous les naturalistes.
Son inscription est libre et gratuite.



Faune-Alsace est gérée par les associations du réseau ODONAT

Faune-Alsace est soutenue par :



Réseau Grand Est

www.faune-champagne-ardenne.org

www.faune-lorraine.org

Visitez, participez !